



**Ambulatorio di Urologia**  
**DISTRETTO DI DOLO – MIRANO – NOALE**  
Direttore Dott. Giorgio Artuso

## **PREPARAZIONE ALL'AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANSRETTALE**

La mattina (o la sera prima) della biopsia eseguire una peretta evacuativa.

Il giorno dell'esame è preferibile il digiuno o una colazione leggera.

Assumere un antibiotico preferibilmente fosfomicina 1 ora prima dell'esame e il giorno dopo, oppure trimetoprim/sulfametossazolo 1 cp alla mattina e 1 cp alla sera per 5 giorni (EAU Urological Infections Guidelines Panel consiglia di non usare i chinolonici nella profilassi di interventi chirurgici in urologia, comprese le biopsie prostatiche transrettali).

I Pazienti portatori di protesi valvolare cardiaca o affetti da prolasso della valvola mitralica devono eseguire una profilassi antibiotica specifica.

I Pazienti che assumono antiaggreganti piastrinici (Cardioaspirina, Aspirinetta, Ascriptin e analoghi) devono sospendere il trattamento 5 giorni prima della biopsia, sostituendolo eventualmente con Eparina a basso peso molecolare (sotto il controllo del Medico Curante).

I Pazienti che assumono Sintrom o Coumadin devono sospendere il trattamento 7 giorni prima sostituendolo con Eparina a basso peso molecolare (sotto il controllo del Medico Curante); il giorno prima della biopsia è necessario eseguire dosaggio del PT (INR) e portare in visione il referto.

È opportuno che il Paziente si presenti all'appuntamento per la biopsia accompagnato da qualcuno.

È consigliabile che il Paziente non guidi l'automobile.

Il giorno dell'esame portare in visione:

- il dosaggio del PSA;
- il modulo di Consenso informato completo di data e firma.